

PROYECTO DE RÓTULO**VICK VITAPYRENA FORTE
PARACETAMOL – FENILEFRINA
Granulado**

Industria Mexicana

Venta libre

Contenido Neto: 5 g

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.

ESTE MEDICAMENTO DEBE SER ACOMPAÑADO POR EL PROSPECTO. POR FAVOR SOLICITELA AL FARMACÉUTICO.**¿Qué contiene VICK VITAPYRENA FORTE?:**

Cada sobre de 5 gramos contiene:

Ingrediente activo: **paracetamol 500 miligramos, clorhidrato de fenilefrina 10 miligramos.***Ingredientes inactivos:* ácido ascórbico, azúcar, ácido cítrico anhidro, aspartame, acesulfame K, amarillo FD&C N° 10, granos sabor miel (perlas de miel), sabor limón, sabor miel.**Acciones:**

Analgésico (Calma el dolor) – Antifebril (Disminuye la fiebre) – Descongestivo (Reduce la congestión nasal).

¿Para qué se usa VICK VITAPYRENA FORTE?:

Para el alivio sintomático de dolores (de cabeza, garganta, musculares) leves a moderados, congestión nasal, alivio de estados gripales y/o resfríos y para reducir la fiebre.

¿Qué personas no pueden recibir VICK VITAPYRENA FORTE?:

NO USE este medicamento si usted es alérgico a cualquier ingrediente de la fórmula. No suministrar a niños menores de 12 años. No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. No use este medicamento si usted posee úlcera estomacal o intestinal activa y/o antecedentes de úlcera recurrente. El producto no puede ser administrado en los siguientes casos: enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo, aumento de tamaño de la próstata, hipertensión, enfermedad de la tiroides, enfermedades cardíacas y diabetes.

Este medicamento contiene gluten.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?:**VER PROSPECTO.****¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?:****VER PROSPECTO.****¿Cómo se usa este medicamento?:**

Preparación: Disolver el contenido del sobre en agua caliente, té u otra infusión caliente. No requiere agregar azúcar.

Vía de administración oral.

*Dosis: Adultos y niños mayores de 12 años: de 12 a 18 años: 1 sobre cada 8 horas. No exceder de 3 sobres en 24 horas. Mayores de 18 años: 1 sobre cada 6 a 8 horas. No exceder 4 sobres en 24 horas.**Niños menores de 12 años: consulte con su médico.***¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?:**

IF-2026-02779064-APN-DERM#ANMAT

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

¿Tiene Ud. alguna pregunta?:

Puede comunicarse con:
0800-999-7625;
ANMAT Responde al 0800-333-1234.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Conservar a temperatura menor a 30°C.

Elaborado por: Procter & Gamble Manufacturing México, S. de R.L. de C.V., Naucalpan, México
Importado por: NEW PGA S.R.L. Ex-Ruta Nacional N°7, Km 0,700, Villa Mercedes, San Luis.
D. T.: Farm. Jimena García.
E. M. A. M. S. Cert.N°: 52.649.
Fecha de última revisión: 25/09/2025

Lote N° Vto

Presentaciones: envases conteniendo 1, 2, 5, 10 sobres.



GARCIA Jimena
CUIL 27256689699

IF-2026-02779064-APN-DERM#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2026-02779064-APN-DERM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 8 de Enero de 2026

Referencia: EX-2025-111356178- NEW PGA - Rotulo - Certificado N52.649

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.01.08 17:26:27 -03:00

MARINA BRAMAJO
Profesional de la Salud
Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.01.08 17:26:27 -03:00

PROYECTO DE PROSPECTO

VICK VITAPYRENA FORTE PARACETAMOL – FENILEFRINA Granulado

Industria Mexicana

Venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.

¿Qué contiene VICK VITAPYRENA FORTE?:

Cada sobre de 5 gramos contiene:

Ingrediente activo: **paracetamol 500 miligramos, clorhidrato de fenilefrina 10 miligramos.**

Ingredientes inactivos: ácido ascórbico, azúcar, ácido cítrico anhidro, aspartame, acesulfame K, amarillo FD&C N° 10, granos sabor miel (perlas de miel), sabor limón, sabor miel.

Acciones:

Analgésico (Calma el dolor) – Antifebril (Disminuye la fiebre) – Descongestivo (Reduce la congestión nasal).

¿Para qué se usa VICK VITAPYRENA FORTE?:

Para el alivio sintomático de dolores (de cabeza, garganta, musculares) leves a moderados, congestión nasal, alivio de estados gripales y/o resfríos y para reducir la fiebre.

¿Qué personas no pueden recibir VICK VITAPYRENA FORTE?:

NO USE este medicamento si usted es alérgico a cualquier ingrediente de la fórmula. No suministrar a niños menores de 12 años. No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. No use este medicamento si usted posee úlcera estomacal o intestinal activa y/o antecedentes de úlcera recurrente. El producto no puede ser administrado en los siguientes casos: enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo, aumento de tamaño de la próstata, hipertensión, enfermedad de la tiroides, enfermedades cardíacas y diabetes.

Este medicamento contiene gluten.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?:

Este producto debe ser administrado con precaución a los pacientes con antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior por la posibilidad de gastritis, úlcera péptica o sangrado gastrointestinal. El paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en sobredosis. La ingesta del paracetamol puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.

Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

No ingiera otra especialidad medicinal que contenga paracetamol conjuntamente con este producto.

No tomar por más de 5 días si el dolor persiste, o más de 3 días para la fiebre. Consulte a su médico. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted toma al mismo tiempo anticoagulantes, anticonvulsivantes u otros antiinflamatorios, consulte a su médico antes de tomar este producto.

No administrar conjuntamente, o antes de dos semanas luego de tratamiento, con medicamentos antidepresivos inhibidores de la MAO o antidepresivos tricíclicos.

Este medicamento contiene gluten.

Diabéticos: este producto contiene azúcar.

Fenilcetonúricos: este producto contiene fenilalanina.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?:

IF-2026-02779110-APN-DERM#ANMAT

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como erupciones cutáneas, alteraciones en la sangre (disminución de plaquetas), náuseas, vómitos, malestar gástrico, enfermedades cardiovasculares y trastornos del sistema nervioso. Existe riesgo de alergia y reacciones cutáneas graves. Si el dolor persiste por más de 5 días o la fiebre persiste por más de 3 días, consulte a su médico.

¿Cómo se usa este medicamento?:

Preparación: Disolver el contenido del sobre en agua caliente, té u otra infusión caliente.

No requiere agregar azúcar.

Vía de administración oral.

Dosis: adultos y niños mayores de 12 años: de 12 a 18 años: 1 sobre cada 8 horas. No exceder de 3 sobres en 24 horas.

Mayores de 18 años: 1 sobre cada 6 a 8 horas. No exceder 4 sobres en 24 horas.

Niños menores de 12 años: consulte con su médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?:

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 /4658-7777.

¿Tiene Usted alguna pregunta?:

Puede comunicarse con:

- 0800-999-7625.

- ANMAT Responde al 0800-333-1234.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Conservar a temperatura menor a 30°C.

Elaborado por: Procter & Gamble Manufacturing México, S. de R.L. de C.V., Naucalpan, México

Importado por: NEW PGA S.R.L. Ex-Ruta Nacional N°7, Km 0,700, Villa Mercedes, San Luis.

Dir. Téc.: Farm. Jimena García.

E.M.A.M.S. Cert. N°: 52.649

Fecha de última revisión: 25/09/2025

Presentaciones: envases conteniendo 1, 2, 5, 10 sobres.

IF-2026-02779110-APN-DERM#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2026-02779110-APN-DERM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 8 de Enero de 2026

Referencia: EX-2025-111356178- NEW PGA - Prospectos - Certificado N52.649

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.01.08 17:26:36 -03:00

MARINA BRAMAJO
Profesional de la Salud
Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.01.08 17:26:36 -03:00